

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 3 月 31 日 (31.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/028441 A1(51) 国際特許分類⁷: C07D 213/69, 309/38,
311/56, 413/10, 407/10, 215/22, A61K 31/366, 31/37,
31/4412, 31/4439, 31/4704, 31/5377, 7/06, A61P 43/00,
17/14, 1/16, 11/00, 13/12, 17/02, 9/10, 9/12(TAKAHASHI, Junya) [JP/JP]; 〒6660262 兵庫県川辺
郡猪名川町伏見台 4-3-84 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013989

(74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.);
〒5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号
住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 9 月 16 日 (16.09.2004)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-324157 2003 年 9 月 17 日 (17.09.2003) JP
特願2003-324156 2003 年 9 月 17 日 (17.09.2003) JP
特願2003-324155 2003 年 9 月 17 日 (17.09.2003) JP
特願2003-324150 2003 年 9 月 17 日 (17.09.2003) JP(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化
学株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED) [JP/JP]; 〒1048260 東京都中央区新川二丁
目 27 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富ヶ原 祥隆
(TOMIGAHARA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒5600013 大阪
府豊中市上野東 3-5-7 1 Osaka (JP). 東 清史 (HI-
GASHI, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒5420012 大阪府大阪市
中央区谷町 6-2-3 3-7 0 6 Osaka (JP). 高橋 淳也


添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CINNAMOYL DERIVATIVES AND USE THEREOF

(54) 発明の名称: シンナモイル誘導体およびその用途



(I)

(57) Abstract: Cinnamoyl derivatives represented by the general formula (I) which have inhibitory effects on type I collagen gene transcription: (I) wherein A is a benzene ring or a pyridine ring; Y_α is a group on carbon which is selected from group X₀ or group Y₀ with the proviso that two adjacent Y_α's may form a group selected from group Z₀ and fused with the ring A; q is an integer of 0 to 5; group X₀ includes OH and so on; group Y₀ includes 3- to 12-membered carbo- and hetero-cycles which may be substituted with OH or the like; group Z₀ includes 5- to 12-membered carbo- and hetero-cycles fused with the ring A which cycles may be substituted with thio or the like; Q_α is optionally substituted hydroxy or amino; W_α is O or -NT_α- (wherein T_α is H or a substituent); and K_α and L_α are each H or a substituent, or K_α and L_α may form optionally substituted, C₁₋₁₀ alkylene or alkenylene, with the proviso that the compound wherein A is a benzene ring, W_α is O, K_α and L_α form 1,3-butadienylene, Q_α is OH, q is 1, and Y_α is OEt is excluded.

/ 続葉有 /